

Webinarserie **UROLOGIE**

FBK | FORTBILDUNGS
KOMMISSION der **ÖGÜ**



ONKOLOGIE DES OBEREN HARNTRAKTES

16.30 **Schnittbildgebung des oberen Harntraktes**

Dr. Nicolai Hübner
Med Uni Wien, AK Bildgebende Diagnostik

17.00 **Endourologische Diagnostik und Therapie bei UTUC / Invasive Diagnostik bei RCC**

PD Dr. Stephan Seklehner
LK Baden, AK Endourologie und Steinerkrankungen

17.30 **Laparoskopische Nephroureterektomie und Wertigkeit der Lymphadenektomie / Warum Nierenteilresektion?**

Prim. Dr. Clemens Georg Wiesinger, MSc
Klinikum Wels-Grieskirchen, AK Laparoskopie und roboterassistierte Chirurgie

18.00 **Nebenwirkungen der systemischen Therapie / Uroonko- logische Nachsorge im niedergelassenen Bereich**

Prim. Dr. Wolfgang Loidl
Ordensklinikum Linz, AK Uroonkologie

18.30 **Best of ASCO GU 2021**

Assoz. Prof. PD Dr. Georg C. Hutterer
Med Uni Graz, Fortbildungskommission der ÖGU

Änderungen vorbehalten!

Wir danken unseren Sponsoren!



GELBE BOX
mHSPC + nmCRPC
RE1 & OP2 verschreibbar¹

Erleada[®]
Apalutamid Filmtabletten

ERLEADA[®] mHSPC

ERLEADA[®] – der erste und derzeit einzige Androgen-Signal-Inhibitor der für mHSPC (all-comers) sowohl zugelassen ist als auch erstattet wird.¹⁻²



ERLEADA[®]: Progression verzögern,
Folgetherapien offenhalten³⁻⁵

www.erleada.at



REFERENZEN:

1. Österreichisches WVZ, Stand Mai 2021. Dunkelgelbe Box für mHSPC seit 01.10.2020. Dunkelgelbe Box für Hochrisiko-nmCRPC seit 01.02.2020. 2. Borno HT, et al. Future Oncol. 2019;15(6):591-599. 3. Smith MR, et al. N Engl J Med 2018; 378: 1409–1418. 4. Smith MR, et al. Eur Urol 2021; 79(1): 150–158. 5. Chi KN, et al. N Engl J Med. 2019; 381(1): 13–24
Fachkurzinformation siehe S. 4

Janssen-Cilag Pharma GmbH
Vorgartenstraße 206b, A-1020 Wien
www.janssen.com/austria

janssen  **Oncology**
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF *Johnson & Johnson*

ONKOLOGIE DES OBEREN HARNTRAKTES

FACHKURZINFORMATION ERLEADA 60 MG FILMTABLETTEN

Bezeichnung des Arzneimittels: Erleada 60 mg Filmtabletten, Qualitative und quantitative Zusammensetzung: Jede Filmtablette enthält 60 mg Apalutamid. Sonstige Bestandteile: Tablettkern: Hochdisperses Siliciumdioxid, Croscarmellose-Natrium, Hypromelloseacetatsuccinat, Magnesiumstearat, Mikrokristalline Cellulose, Mikrokristalline Cellulose, siliciumdioxid-beschichtet. Filmüberzug: Eisen(II, III)-oxid (E172), Eisen(III)-hydroxid-oxid x H₂O (E172), Macrogol, Poly(vinylalkohol) (teilweise hydrolysiert), Talkum, Titandioxid (E171). **Anwendungsgebiete:** Erleada ist indiziert zur Behandlung erwachsener Männer mit nicht-metastasiertem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (nmCRPC), die ein hohes Risiko für die Entwicklung von Metastasen aufweisen und zur Behandlung erwachsener Männer mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakarzinom (mHSPC) in Kombination mit Androgendeprivationstherapie (ADT). **Gegenanzeigen** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder sonstigen Bestandteile. Frauen, die schwanger sind oder schwanger werden könnten. **Inhaber der Zulassung:** Janssen Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B 2340 Beerse, Belgien. **Vertrieb für Österreich:** JANSSEN-CILAG Pharma GmbH, Vorgartenstraße 206B, A-1020 Wien. **Verschreibungspflicht/Apothekenpflicht:** Rezept- und apothekenpflichtig. **ATC-Code:** L02BB05 Weitere Angaben zu Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung, Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und sonstigen Wechselwirkungen, Schwangerschaft und Stillzeit sowie Nebenwirkungen entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Fachinformation.

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Es ist daher wichtig, jeden Verdachtsfall einer Nebenwirkung in Bezug auf „ERLEADA“ zu melden.

AT_CP-136729_17Dez2020